

КРАТКАЯ ПАМЯТКА ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТА К ИССЛЕДОВАНИЯМ

УЗИ гинекологическое трансвагинальное: Исследование проводится при опорожненном мочевом пузыре. □

УЗИ гинекологическое трансабдоминальное: За 1 час до исследования выпить 600-800 мл жидкости. На исследование прибыть с полным мочевым пузырем. □

УЗИ предстательной железы трансректальным датчиком: Накануне исследования сделать очистительную клизму. Утром за 2 часа до исследования еще одну клизму. За час до исследования выпить 600-800мл воды. □

УЗИ желудка. Рентгеноскопия желудка. Эзофагогастродуоденоскопия: Исследования выполняются натощак. Накануне легкий ужин не позднее 18.00, в день исследования не принимать пищу, лекарства, не курить. Для проведения эзофагогастродуоденоскопии лицам старше 50 лет наличие ЭКГ обязательно, проведенное не позднее 14 дней до исследования. При проведении УЗИ желудка детям иметь при себе 200мл сока или сладкого чая.

□

УЗИ абдоминальное. Рентгенография поясничного отдела позвоночника.

Урография: Исследование проводится натощак. За 3 суток до исследования соблюдать диету, не употреблять продуктов, вызывающих газообразование в кишечнике.

Последний прием пищи — в вечернее время (легкий ужин) не позднее 18.00. Если исследование проводится после 15 часов, можно позавтракать в 8-10 часов утра, после чего нельзя употреблять пищу и воду. При необходимости назначается прием препаратов, улучшающих пищеварение (фестал или мезим 3 раза в день по 1 таб. после еды) и снижающих газообразование (активированный уголь или симетикон).

Колоноскопия. Ирригоскопия: Исследование выполняется после очищения кишечника препаратами назначенными лечащим врачом. Возможен легкий завтрак. Лицам старше 50 лет наличие ЭКГ обязательно, проведенное не позднее 14 дней до исследования.

□

Ректороманоскопия. Консультация проктолога: Очистительная клизма (2 литра) за 1,5-2 часа до исследования. □

Стресс-ЭКГ (Велоэргометрия. Тредмил-тест); Стресс-ЭхоДКГ (с ЧПЭС или тредмилом): Проводятся натощак или через 2 часа после приема пищи. Прием лекарственных препаратов перед стресс-исследованием необходимо обсудить с

лечащим врачом. При себе иметь ЭКГ. Пациентам, перенесшим инфаркт миокарда при назначении Стресс –ЭКГ (ВЭМ или тредмил- тест) необходимо иметь Эхо-КГ.

Суточное (холтеровское) мониторирование ЭКГ: Мужчинам необходимо удалить волосяной покров на груди. Обязательно иметь при себе последнюю ЭКГ.

Исследование функции внешнего дыхания (спирография): При себе иметь результат рентгенологического исследования органов грудной клетки. Проведение данного исследования строго запрещено при открытой форме туберкулеза.

За более подробной информацией по подготовке к диагностическим исследованиям необходимо обращаться к лечащему врачу.